

VIRONEX BORDO

Fungicida in polvere bagnabile (WP)

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M1+27

VIRONEX BORDO - Registrazione Ministero della Salute n. 12583 del 12/05/2006

composizione

100 g. di prodotto contengono

CIMOXANIL puro g. 3

RAME METALLO g. 22,5

(sotto forma di Poltiglia Bordolese)

Coformulanti q.b. a g. 100

Contenuto netto:

g. 250-500 Kg 1-5-10-20

Partita n.

IQV Industrias Químicas del Valles s.a.

Av. Rafael Casanova, 81

08100 Mollet del Valles

Barcelona (Spagna)

Stabilimento di produzione

IQV Industrias Químicas del Valles s.a.

Mollet del Valles, Barcelona (Spagna)

Distribuito da:

IQV ITALIA Srl

Via del Progresso, 2 - Fiano Romano (Roma)

Tel 0765 400086



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H332 Nocivo se inalato. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la polvere e gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

REAZIONE: P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l' infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fasi di miscelazione/caricamento del prodotto utilizzare sempre abbigliamento da lavoro, guanti e mascherina FFP2. Per quanto riguarda l'applicazione in campo su vite e pomodoro con trattore o manuale indossare tuta da lavoro, calzari e guanti. Durante l'applicazione in campo con trattore su melanzana indossare guanti protettivi. Durante l'applicazione manuale in campo su melanzana indossare tuta da lavoro e guanti. In ogni caso, date le caratteristiche sensibilizzanti del prodotto, andrebbero sempre indossati tuta da lavoro e visiera durante le fasi di preparazione e applicazione del prodotto. In generale, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di rientro indossare sempre abiti da lavoro. Date le caratteristiche sensibilizzanti del prodotto anche i guanti andrebbero sempre indossati. Le attività di raccolta e manutenzione in campo su vite e pomodoro sono possibili solo utilizzando guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per gli usi su vite (applicazioni precoci) e ortaggi a frutto. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per l'uso su vite (applicazioni tardive).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 3% e RAME 22,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL (Derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME METALLO - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il VIRONEX BORDO è un fungicida per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della melanzana. Il prodotto è costituito da due principi attivi di cui il primo (Cimoxanil) ha un'azione bloccante, in quanto penetra nelle foglie, mentre il secondo (Rame sotto forma di poltiglia bordolese) possiede una certa persistenza garantendo la protezione della pianta per vari giorni da una nuova infezione. Per la presenza del rame il prodotto esplica anche un'efficace attività contro le Batteriosi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Non effettuare più di 4 trattamenti per ciclo colturale.

VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), intervenire alla dose di 330-1000 g/hl d'acqua (3,3-4 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare non più di 4 applicazioni per stagione, iniziando quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità e con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni.

POMODORO E MELANZANA (in campo): contro Peronospora (*Phytophthora infestans*, *Phytophthora capsici*), intervenire alla dose di 330-1000g/hl d'acqua (3,3-4 kg/ha), utilizzando dai 400 ai 1000 l/ha di acqua; effettuare da 3 a 4 applicazioni a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta al verificarsi delle condizioni favorevoli alle avversità, con un intervallo tra i trattamenti minimo di 7 giorni.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare VIRONEX BORDO ad altri fungicidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina (polisolfuri).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura.

CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature superiori ai 40°C.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO E MELANZANA IN CAMPO, 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER VITE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.