

# ERCOLE® GR

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole

## ERCOLE GR - Composizione:

- Lambda-cialotrina pura . . . . .g.0,4
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . .g. 100

© Marchio registrato



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere la fuoriuscita (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501).

## TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

**Oxon Italia S.p.A.**

Sede legale: via Carroccio 8  
20123 - Milano  
Tel. 02-353781

Autorizzazione Ministero della Salute  
n. 16279 del 08.05.2017

## Officina di produzione:

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)  
SIPCAM INAGRA S.A. - Sueca (Spagna)  
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

## Officina di confezionamento:

Kollant S.r.l. - Maniago (PN)  
Sinapak S.r.l. - Stradella (PV)

## Distribuito da:

ITAL-AGRO S.r.l. - Salerano sul Lambro (LO)  
SIPCAM ITALIA S.p.A. - via Sempione 195, Pero (MI)

Taglie 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 50 Kg  
Partita n.:

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per applicazioni con trattore e manuali, utilizzare guanti adatti durante le fasi di caricamento e di applicazione del prodotto.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Prodotto altamente tossico per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture in presenza di api.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** le piretrine bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post- sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

**Sintomi a carico del SNC:** tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

**Terapia:** sintomatica e di rianimazione.

**AVVERTENZE:** Consultare un Centro Antiveneni

## CARATTERISTICHE

ERCOLE GR è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina. La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, elateridi, larve di diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*), tipule, bibionidi e altri ditteri.

## MODALITA', DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

**ERCOLE GR** si impiega unicamente in campo, localizzato nel solco di semina o di trapianto, alla dose di 10-15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:

**Mais:** localizzato alla semina alla dose di 10-15 kg/ha e/o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais, alla dose di 12-15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Diabrotica.

**Patata:** localizzato alla semina e/o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura, alla dose di 10-15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Elateridi.

**Mais dolce**

**Sorgo e Miglio**

**Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone)**

**Barbabetola da zucchero**

**Soia**

**Cotone**

**Girasole**

**Cucurbitacee a buccia edule (Cetriolo e Zucchini)**

**Cucurbitacee a buccia non edule (Melone, Anguria e Zucca)**

**Lattughe e simili (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione,**

**Rucola, Dolcetta, Barbarea, prodotti Baby Leaf), Spinaci e simili**

**Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa (Cavoli verza, Cavoli cappuccio) ed altri**

**Colza**

**Carota**

**Tabacco**

**Semi di papavero**

**Floreali ed ornamentali**

**Vivai di piante arboree**

**Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Lattughe e simili, Spinaci e simili, Mais, Colza, Sorgo e Miglio, Barbabetola da zucchero, Carota, Patata, Solanacee, Soia, Girasole.**

**Cipolla (compreso cipollotto)<sup>(1)</sup>:** localizzato alla semina alla dose di 10-15 kg/ha, per il controllo di nottue, elateridi e larve di Melolonta (Melolontha spp.).

**Per tutte queste colture trattare esclusivamente alla semina o al trapianto. Consentito un solo trattamento per anno (2 trattamenti/anno per mais, patata, mais dolce, sorgo e miglio).**

## COMPATIBILITA'

**Il prodotto si impiega da solo.**

## ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

<sup>(1)</sup> Periodo di autorizzazione dal 19 febbraio 2019 al 18 giugno 2019

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 febbraio 2019